

Topotekan (Hycamtin) (SCLC)

K. Topotekan (Hycamtin)*	2,3 mg/m ² /dag	Per os	Dag 1-5
--------------------------	----------------------------	--------	---------

*Om po behandling inte kan ges kan schema för iv behandling användas.

Inför kur 1: P-Cystatin C.

För varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Om GFR <60 ml/min skall försiktighet iakttas, och eventuellt skall preparatet inte ges.

Cykelintervall 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

K Topotekan sväljs hela tillsammans med lite vatten. Kapslar får ej tuggas, krossas eller delas. OBS! Om kräkning uppträder efter att dosen K Topotekan tagits skall **inte** en andra dos tas den dagen.

Information till patienten: Dosetten bör förvaras ljusskyddat. Helst kallt.

Efter administrering: Patienten skall informeras om att fördröjd diarré är en vanlig biverkan.

Patienten skall ha Loperamid hemma att ta vid behov vid insättande av diarré och patienten ska förses med schema för intag av Loperamid.

Förebyggande behandling av diarré med läkemedel mot diarré är viktigt. Svåra fall av diarré kan kräva administrering av orala eller intravenösa elektrolyter och vätskor och avbrott i behandlingen med topotecan. För patienter som får diarré av grad 3 eller 4 ska doserna minskas med 0,4 mg/m²/dygn för de följande behandlingsomgångarna. Patienter som får diarré av grad 2 kan behöva följa samma riktlinjer gällande dosmodifiering. Topotecaninducerad neutropeni kan orsaka neutropen kolit.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	Hycamtin
> 1,5	> 100	100%
1,5-0,5	99-75	75%
<0,5	<50	Beh. uppskjutes en vecka