

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Capecitabin

(GI)

T Capecitabin (Xeloda) 1 250 mg/m<sup>2</sup> x 2 per dag \* Dag 1-14

**\*Observera** att dosen kan behöva justeras hos ex. äldre patienter, patienter med nedsatt njur- och leverfunktion.

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.

**Dosreduktion** för patienter med sänkt kreaclarence <50 ml/min enl. FASS.

**Kur 1-2:** Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar.

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 1.

**DAG 1-14 KUR \_\_\_\_\_ Ssk.sign Läk.sign**

**T Capecitabin** \_\_\_\_\_ mg po x 2 **OBS! Starta alltid med kvällsdosen!** \_\_\_\_\_  
motsvarar morgondos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
kvällsdos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
Delat i dosett dag 1-14 \_\_\_\_\_

**DAG 1-14 KUR \_\_\_\_\_ Ssk.sign Läk.sign**

**T Capecitabin** \_\_\_\_\_ mg po x 2 **OBS! Starta alltid med kvällsdosen!** \_\_\_\_\_  
motsvarar morgondos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
kvällsdos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
Delat i dosett dag 1-14 \_\_\_\_\_

**DAG 1-14 KUR \_\_\_\_\_ Ssk.sign Läk.sign**

**T Capecitabin** \_\_\_\_\_ mg po x 2 **OBS! Starta alltid med kvällsdosen!** \_\_\_\_\_  
motsvarar morgondos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
kvällsdos \_\_\_\_\_ tabl á 500 mg  
Delat i dosett dag 1-14 \_\_\_\_\_

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_