

## SOX (colorektal)

|                        |                                  |                     |          |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Oxaliplatin</b>     | 130 mg/m <sup>2</sup>            | iv inf 30-60 min    | Dag 1    |
| <b>K Teysuno (S-1)</b> | 25 mg/m <sup>2</sup> x 2 per dag | Kapsel 15 och 20 mg | Dag 1-14 |

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Cystatin, Krea.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: Efter 3 kurer.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4 med start dag 2 i kuren.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av biverkningar.

**OBS:** Teysuno skall **inte** tas i samband med måltid. Senast 1 tim innan eller tidigast 1 tim efter måltid.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

**Dosreduktion** för patienter med sänkt kreaclarence < 50 ml/min enl. FASS

### Dosreduktion vid hematologiska biverkningar

| B-LPK (x10 <sup>9</sup> /L) | B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L) | Oxaliplatin             |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| >3,0                        | >100                        | 100%                    |
| 2,9-2,5                     | 99-75                       | 75%                     |
| 2,4-2,0                     | 74-50                       | 50%                     |
| <2,0                        | <50                         | Beh uppskjutes en vecka |

### Dosreduktion vid hematologiska biverkningar

| Tox grad   | Neutrofila (10 <sup>9</sup> /L) | Trombocyter (10 <sup>9</sup> /L) | Teysono                     |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>0</b>   | ≥2.0                            | ≥100                             | 100%                        |
| <b>1</b>   | ≥1.5-<2.0                       | ≥75-<100                         | 100%                        |
| <b>2</b>   | ≥1.0-<1.5                       | ≥50-<75                          | 75%                         |
| <b>3-4</b> | <1.0                            | <50                              | Uppehåll tills återhämtning |

**Dosreduktion vid diarré av Teysuno**

| Tox grad | Diarré   | Teysono   |
|----------|--|---|
| 0        | Ingen diarré, och ingen ökning av avf.frekvens   | 100%  |
| 1        | <4 avföringar per dag  | 100%  |
| 2        | 4-6 avföringar per dag   | Uppehåll tills grad 0-1, sedan<br>1 gången: Ingen dosjustering<br>2 gången: Dosjustering med 5 mg/m <sup>2</sup> (20 mg/m <sup>2</sup> )<br>3 gången: Dosjustering med 5 mg/m <sup>2</sup> (15 mg/m <sup>2</sup> )<br>4 gången: Avbryt Teysuno behandling |
| 3        | ≥ 7 avföringar per dag, inkontinens (om pat var kontinent före beh), eller svåra kramper | Uppehåll tills grad 0-1, sedan<br>1 gången: Dosjustering med 5 mg/m <sup>2</sup> (20 mg/m <sup>2</sup> )<br>2 gången: Dosjustering med 5 mg/m <sup>2</sup> (15 mg/m <sup>2</sup> )<br>3 gången: Avbryt Teysuno behandling                                 |
| 4        | ≥10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support                   | Avbryt Teysuno behandling   |

**Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar**

| Biverkningar                         | Duration av biverkningar |  | Bestående biv mellan behandlingarna |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
|                                      | 1-7 dagar                | > 7 dagar  |                                     |
| Dysestesier med köldkänsla           | Ingen dosändring         | Ingen dosändring   | Ingen dosändring                    |
| Parestesier                          | Ingen dosändring         | Ingen dosändring   | Behandlingen avbryts                |
| Parestesier med smärta               | Ingen dosändring         | 1 gången: Sänk dosen 25%<br>2 gången: Sänk dosen ytterligare 25%<br>3 gången: Behandlingen avbryts | Behandlingen avbryts                |
| Parestesier med funktionsnedsättning | Ingen dosändring         | 1 gången: Sänk dosen 50%<br>2 gången: Behandlingen avbryts   | Behandlingen avbryts                |

**Om** man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med Teysuno tills progress eller oacceptabla biverkningar av Teysuno.