

**Pågående kliniska studier på urologen, Karolinska. Har du en patient som kan vara aktuell så ring el meddela i Take Care
Kontakt Solna: Kirsti 517 70429, Tina 517 71566, Huddinge: Maria 585 87717, Ludmila 585 87746**

Studie, PI	Syfte	Inkl kriterier
SPCG15 O Akre olof.akre@ki.se Tel: 070-964 04 04	Att jämföra kirurgisk terapi med fulldos strålterapi vid lokalt avancerad PCa. (n= 1200) Studien går i Solna	<ul style="list-style-type: none"> • T3, förekomst av Gleason 4 mönster • N0, M0
SPARTAN, ARN-509-003 A Kjellman anders.kjellman@karolinska.se Tel: 073-620 43 26 Janssen	En randomiserad, multicenter fas 3 studie avseende ARN-509 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa. (n=1200) Studien går på Huddinge	<ul style="list-style-type: none"> • Kastrationsresistens (utan peroral antiandrogen) • PSADT ≤ 10 månader, Nx, M0
ARAMIS, Arinomet 3104007 M Hellström Tel: 076-770 6263 Orion/Bayer	En randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa. (n=1500) Studien går i Solna	<ul style="list-style-type: none"> • Kastrationsresistens (utan peroral antiandrogen) • PSADT ≤ 10 månader, Nx, M0
PROSPER- MDV3100-14, M Olsson mats.j.olsson@karolinska.se alt meddela i TakeCare Medivation, Astellas	En randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende enzalutamid vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa. (n=1560) Studien går i Solna	<ul style="list-style-type: none"> • Kastrationsresistens (utan peroral antiandrogen) • PSADT ≤ 10 månader, Nx, M0
EMBARK M Hellström Tel: 076-770 6263 Medivation, Astellas	En randomiserad fas 3 studie, pat med icke-metastaserande, Högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning. Beh med enza+leuprolin, placebo+leuprolin el enbart enzalutamid (n=1860) Studien går i Solna	<ul style="list-style-type: none"> • PSADT < 9 mån • Nx,M0
PRESIDE, 9785-MA-1001 M Hellström+ M Hjäl- Eriksson, RaH Tel: 076-770 6263 Astellas, Medivation	En multicenter, fas 3 studie avseende enzalutamid vid kastrationsresistent metastaserad PCa där kemoterapi tidigare ej givits. Rekrytering av patienter till studien i första hand från urologen. Samtliga patienter får initialt enzalutamid . Vid terapivikt sker randomisering till docetaxel med eller utan fortsatt enzalutamid . (n=650) Studien går i Solna	<ul style="list-style-type: none"> • Kastrationsresistens (utan peroral antiandrogen) • N1/M1