

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Docetaxel-14

(Prostata ca)

Inf Docetaxel

50 mg/m²

Dag 1, 15

Provtagning vid start och 1 gång mån: Blodstatus, Neutr, leverstatus, Krea, PSA.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall: 14 dagar.

Efter kur: Kortisonschema för lågdos Docetaxel.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign Läk.sign

Po. tas 1 tim före behandling

T/Inj Betapred 8 mg iv/po _____

Tim 0 kl _____ Bltr _____ Puls _____

Inf Docetaxel _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 1 tim. _____

Start _____

Stopp _____

Bltr kontroll +15 min kl _____ Bltr _____ Puls _____

DAG 15 beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign Läk.sign

Po. tas 1 tim före behandling

T/Inj Betapred 8 mg iv/po _____

Tim 0 kl _____ Bltr _____ Puls _____

Inf Docetaxel _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 1 tim. _____

Start _____

Stopp _____

Bltr kontroll +15 min kl _____ Bltr _____ Puls _____

Peroral profylax

Ssk.sign

Kortisonschema vid behandling med lågdos Docetaxel _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____