

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Veckovis Docetaxel (Taxotere) (Prostata ca)

Inf Docetaxel	30 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
---------------	----------------------	-------

**Provtagning vid start och 1 gång mån:** Blodstatus, Neutr, leverstatus, Krea, PSA.

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.

**Kur 1-2:** Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

**Cykelintervall:** 7 dagar. Beh ges 6 v, därefter 2 veckors uppehåll. Behandlingen pågår tills progress eller oacceptabla biverkningar.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 1.

**VECKA** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/ Inj Betapred 8 mg iv/po** \_\_\_\_\_

**Tim 0** kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**Inf Docetaxel** \_\_\_\_\_ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min. \_\_\_\_\_

Start  
Stopp

Bltr kontroll +15 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**VECKA** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/ Inj Betapred 8 mg iv/po** \_\_\_\_\_

**Tim 0** kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**Inf Docetaxel** \_\_\_\_\_ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min. \_\_\_\_\_

Start  
Stopp

Bltr kontroll +15 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**VECKA** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/ Inj Betapred 8 mg iv/po** \_\_\_\_\_

**Tim 0** kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

**Inf Docetaxel** \_\_\_\_\_ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min. \_\_\_\_\_

Start  
Stopp

Bltr kontroll +15 min kl \_\_\_\_\_ Bltr \_\_\_\_\_ Puls \_\_\_\_\_

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_