

# CABAZITAXEL (Prostata ca)

<b>Cabazitaxel *</b>	25 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>Prednisolon</b>	5 mg x 2	tabl po	Kontinuerligt

\* 20 mg/m<sup>2</sup> om tidigare cytostatikabehandling.

T. Prednisolon 5 mg x 2 po dagligen, så länge behandling ges.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, leverstatus, PSA.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

PVC fritt filter och aggregat.

Cykelintervall 21 dagar.

Framflyttande av behandling eller dosreduktion kan vara nödvändigt vid diarré grad  $\geq 3$ .

Patienten skall ha Loperamid hemma att ta vid behov vid insättande av diarré och patienten ska förses med schema för intag av Loperamid.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Dosreduktion:

LPK (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Cabazitaxel
2,9-2,5	99-75	75%
$\leq 2,4$	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar