

GOP sid 1/2

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

GOP

(Testikelca. recidiv)

Inf Gemcitabin	800 mg/m ²	Dag 1 och 8
Inf Oxaliplatin	130 mg/m ²	Dag 1
Inf Paklitaxel	80 mg/m ²	Dag 1 och 8

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea , AFP, HCG, leverstatus.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska vara tillgänglig de första 10 min av infusionstiden

För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 och 2 med Paklitaxel ges enligt följande: Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur dvs efter dag 1: Antiemetikaschema nr 5.

Efter dag 8: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Po. tas 2 tim före behandling

T/ Inj Betapred 8 mg po/iv _____

T/ Inj Tavegyl 2 mg po/iv _____

T. Ranitidin 150 mg po alt. (alt iv, enl nedan) }

Inf Zantac 50 mg iv i 100 ml NaCl. Inf.tid 10 min) }

Start
Stopp

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 30 min

Start
Stopp

OBS! Endast Glucos i droppaggregatet samt spoldroppet med Oxaliplatin!

Inf Oxaliplatin _____ mg iv i 500 ml Glucos 50 mg/ml. Inf.tid 1 tim

Start
Stopp

Tim 0 kl _____ Bltr _____ Puls _____

PVC fritt filter och aggregat till Paklitaxel.

Inf Paklitaxel _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim

Start
Stopp

Bltr kontroll +15 min kl _____ Bltr _____ Puls _____

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 5.

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____

DAG 8	beställs till kl _____ avvakta ja nej	Ssk.sign	Läk.sign
Po. tas 1 tim före behandling			
T/ Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
T/ Inj Tavegyl 2 mg po/iv		_____	_____
T. Ranitidin 150 mg po alt. (alt iv , enl nedan)	}	_____	_____
Inf Zantac 50 mg iv i 100 ml NaCl. Inf.tid 10 min)			
		Start	
		Stopp	
Inf Gemcitabin _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 30 min		_____	_____
		Start	
		Stopp	
Tim 0 kl _____ Bltr _____ Puls _____			
PVC fritt filter och aggregat till Paklitaxel.			
Inf Paklitaxel _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 1 tim		_____	_____
		Start	
		Stopp	
Bltr kontroll +15 min kl _____ Bltr _____ Puls _____			

Peroral profylax	Ssk.sign
Antiemetikaschema nr 1.	_____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____