

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Cetuximab

(GI)

Inf Cetuximab 500 mg/m ² (avrundas till närmaste 100-tal) Dag 1
--

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Patienten övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare skall finnas tillgänglig de första 10 minuterna av infusionstiden.

Kur 1: Ge infusion på 2 tim, därefter kan de ges på 1 tim.

Cykelintervall: 14 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr. 1.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Innan start av Cetuximab Kl _____ Bltr _____ Puls _____

Inj Tavegyl 2 mg iv ges 30 min innan start kl _____

Inj Betapred 8 mg iv (ges endast de två första kurena) _____

Ringa in inf tid

Inf Cetuximab _____ mg iv i 500 ml NaCl, inf tid 1 tim eller 2 tim _____

Start _____
Stopp _____

15 min efter Cetuximabstart, sedan v.b.: Kl _____ Bltr _____ Puls _____

Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Cetuximab – se lokala instruktioner!

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____