

# Cetuximab/FLOX

(colorektal)

<b>Cetuximab</b>	500 mg/m <sup>2</sup> (avrunda till närmaste 100-tal)	iv inf 2 tim	Dag 1
<b>Oxaliplatin</b>	85 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 30-60 min	Dag 1
<b>5-Fluorouracil</b>	500 mg/m <sup>2</sup> (jämna 50-tal)	iv bolus 2-3 min	Dag 1-2
<b>Calciumfolinat</b>	100 mg (30-40 min efter 5FU)	iv bolus 2-5 min	Dag 1-2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1: Ge Cetuximab infusion på 2 tim, därefter kan de ges på 1 tim. Gäller dosreduktion enl index regim 9-13.

Patienten övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare skall finnas tillgänglig under de första 10 minuterna av infusionstiden.

Cykelintervall 14 dagar.  
Utvärderingsintervall efter 4 kurer.  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Cetuximab- se lokala instruktioner.

## Dosreduktion:

Neutrofila (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	FLOX
<1,3	<100	Avvakta till neutrofila $\geq 1.5 \times 10^9/L$ (TPK $\geq 100 \times 10^9/L$ ). Kan skjutas upp 2 v med oförändrad dos. Om inte värdena återhämtas v 4 skall 5-FU reduceras med 20%

## Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar:

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biv mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts

**Om** man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med 5-FU/Calciumfolinat tills progress eller oacceptabla biverkningar av 5-FU.