

Cisplatin/5-FU (analcancer)

	Anal	Anal med SB		
Cisplatin	100 mg/m ²	75-100 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
5-Fluorouracil	1000 mg/m ² /dygn	750 mg/m ² /dygn	iv inf 24 tim	Dag 1-5

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin C och Audiometri.

Inför kommande kurer: Blodstatus, Neutr, Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Under kur dag 1: Vikt x 2. Inj/T Furix 20 mg vid viktökning >1 kg.

Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance) före behandlingsstart. Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin. Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin ges med forcerad diures. Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: kontinuerligt 5-FU dropp: Antiemetikaschema nr 1.

pump: Antiemetikaschema nr 6 med start dag 2 i kuren.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Cisplatin	5-FU
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
2,4-2,0	74-50	50%	50%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka	

Dosreduktion:

GFR ml/min	Cisplatin	5-FU
70-79	100%	100%
60-69	75% dag 1	100%
<60	Cisplatin ersätts med Carboplatin doserat enligt Calverts formel	