

Bevacizumab+FLOX (colorektal)

Bevacizumab (Avastin)	5 mg/kg (om lämpligt, jämna 100-tal)	iv inf 90/60/30 min	Dag 1
Oxaliplatin	85 mg/m ²	iv inf 30-60 min	Dag 1
5-Fluorouracil	500 mg/m ² (jämna 50-tal)	iv bolus 2-3 min	Dag 1-2
Calciumfolinat	100 mg (30-40 min efter 5FU)	iv bolus 2-5 min	Dag 1-2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före administrering:

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Bevacizumab kan ges före eller efter cytostatikabehandlingen.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess (minst 5 veckors uppehåll till planerad operation).

Cykelintervall 14 dagar.

Utvärderingsintervall efter 4 kurer.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

Dosreduktion:

Neutrofila (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	FLOX
<1,3	<100	Avvakta till neutrofila ≥ 1.3 x10 ⁹ /L (TPK ≥ 100x10 ⁹ /L). Kan skjutas upp 2 v med oförändrad dos. Om inte värdena återhämtas v 4 skall 5-FU reduceras med 20%

Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar:

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biv mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts

Om man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med 5-FU/Calciumfolinat tills progress eller oacceptabla biverkningar av 5-FU.