

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FOLFOXIRI

(GI)

Inf Irinotekan	165 mg/m ²		Dag 1
Inj Oxaliplatin	85 mg/m ²		Dag 1
Inf Calciumfolinat	200 mg/m ²	(jämna 50-tal)	Dag 1
Inf 5-FU	3200 mg/m ² /48 h	(jämna 100-tal)	Dag 1 till 3

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: 14 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6 med start dag 2 i kuren.

Förse patienten med Loperamidschema.

DAG 1

beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign Läk.sign

K Emend 125 mg mg po

Inj Betapred 8 mg iv

Inj Ondansetron 8 mg iv

Inj Atropin 0.25 mg sc

Inf Irinotekan _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

OBS! Endast Glukos i droppaggregat samt i spoldroppet vid Oxaliplatin

Oxaliplatin och Calciumfolinat startas samtidigt!

Inf Oxaliplatin _____ mg iv i 500 ml Glukos Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

Inf Calciumfolinat _____ mg iv i 500 ml Glukos Inf.tid 1 tim

Start

Stopp

Inf 5-FU _____ mg Kontinuerlig Infusionspump 48 tim

Start

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 6.

DAG 3

Ssk.sign

Patienten kommer åter för bortkoppling av den kontinuerliga infusionen

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____