

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FOLFOX

(GI)

Inf Oxaliplatin	85 mg/m ²		Dag 1
Inf Calciumfolinat	200 mg/m ²	(avrunda till jämna 50-tal)	Dag 1
Inj 5-FU	400 mg/m ² bolus injektion	(avrunda till jämna 50-tal)	Dag 1
Inf 5-FU	2800 mg/m ² /46 h	(avrunda till jämna 100-tal)	Dag 1 till 3

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: 14 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 3 med start dag 2 i kuren.

DAG 1	beställs till kl _____	avvakta ja nej	Ssk.sign	Läk.sign
Inj Betapred 8 mg iv			_____	_____
Inj Ondansetron 8 mg iv			_____	_____
OBS! Endast Glukos i droppaggregatet samt spoldropp.				
Oxaliplatin och Calciumfolinat startas samtidigt!				
Inf Oxaliplatin _____ mg iv i 500 ml Glukos	Inf.tid 30-60 min	}	Start _____	_____
			Stopp _____	_____
Inf Calciumfolinat _____ mg iv i 500 ml Glukos	Inf.tid 1 tim	}	Start _____	_____
			Stopp _____	_____
Inj 5-FU _____ mg iv bolus	Inj.tid 2-3 min		_____	_____
Inf 5-FU _____ mg iv	Kontinuerlig infusionspump		Start _____	_____
	Inf.tid 46 tim		_____	_____

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 3.

DAG 3

Ssk.sign

Patienten kommer åter för bortkoppling av den kontinuerliga infusionspumpen _____

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____