

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Karboplatin/Gemcitabin

(blåsa, nedsatt njurfunktion)

Inf Gemcitabin	1000 mg/m ²	Dag 1 och 8
Inf Karboplatin*	AUC 5	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin C.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: dvs Dag 2: Antiemetikaschema nr 4.

Dag 9: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 Beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Po. tas 1 tim före behandling

T/ Inj Ondansetron 8 mg po/iv _____

T/ Inj Betapred 8 mg po/iv _____

**T/ Inj Tavegyl 2 mg po/iv (Endast vid recidivbeh el. >5 givna beh)* _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inf Karboplatin _____ mg iv i 500 ml Glukos. Inf.tid 30* min _____

**OBS! Lägre infusionshastighet från cykel 5 eller vid recidivbehandling. Inf tid 60 min.*

Start _____

Stopp _____

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 4. _____

DAG 8 Beställs till kl _____ **Ssk.sign Läk.sign**

Po. tas 1 tim före behandling

T/ Inj Ondansetron 8 mg po/iv _____

T/ Inj Betapred 8 mg po/iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 500 ml NaCl. Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____