

Nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer

Aktuell information om långtidsuppföljning efter barncancer med anledning av covid-19

Uppdatering 20 april 2020: Tillägg om riktlinjer från IGHG

Rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer gäller så länge annat inte har beslutats. Det pågår i hela landet arbete med omprioriteringar för att möta den uppkomna situationen med covid-19. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. I grunden gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående riskgrupper och till allmänhet.

Syftet med detta dokument är att ge stöd till dem som arbetar med långtidsuppföljning för vuxna efter barncancer, samt till annan sjukvårdspersonal involverade i vården av denna patientgrupp.

Upp till 18 års ålder

Individuella bedömningar av risker för covid-19 för individer under 18 års ålder som genomgått barncancerbehandling utförs på respektive Barncancercentrum.

Över 18 års ålder

Bakgrund

Under covid-19-pandemin hör vuxna individer som behandlats för barncancer av sig till landets uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer för att få svar på om de tillhör en riskgrupp för svår covid-19-infektion.

Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) har enats om att det är rimligt att definiera de individer som genomgått lungtoxisk cancerbehandling under barndomen, enligt det nationella vårdprogrammets definition, som riskgrupp. Dessa patienter rekommenderas idag årlig influensavaccination samt att tillse fullgott skydd mot pneumokocker.

Individer med risk för funktionell hyposplenism eller med aspleni definieras också som riskgrupp för allvarlig bakteriell infektion.

Barncancerbehandlingar som kan vara associerade med ökad risk för lunginflammation eller allvarlig bakteriell infektion i vuxen ålder

Lungtoxiska behandlingar:

- Strålbehandling mot lungor/mediastinum >10-15 Gy
- Helkroppsbestrålning
- Busulfan-Melfalan
- Bleomycin
- CCNU
- BCNU > 600 mg/m²

- Lungkirurgi som har lett till nedsatt lungfunktion

Risk för funktionell hyposplenism:

- Stråldos mot mjälte > 10 Gy

Riktlinjer från International Guideline Harmonization Group

Som komplement till ovanstående rekommendationer finns också internationella riktlinjer. International Guideline Harmonization Group (IGHG) har i samband med covid-19-pandemin tagit fram fyra olika riktlinjer som stöd till patienter som haft cancer som barn, tonåringar eller unga vuxna. De handlar om vem som kan tänkas ha en högre risk att bli allvarligt sjuk om man drabbas av covid-19, vad man bör tänka på för att skydda sig både rent allmänt men även för den som kan ha en högre risk för allvarlig sjukdom samt vad man bör göra om man blir sjuk. Här finns riktlinjerna: <https://www.ighg.org/>

2020-04-15

*För nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer,
Marianne Jarfelt, ordförande*