

Nationella vårdprogramgruppen prostatacancer

## Tillfälliga rekommendationer gällande handläggning av män med misstänkt eller känd prostatacancer med anledning av covid-19

För att minska smittspridningen kan utredning och behandling av prostatacancer behöva anpassas för vissa patientgrupper. Detta gäller särskilt personer över 70 års ålder och de med lung- eller hjärtsjukdom.

Handläggningen av personer med misstänkt eller känd prostatacancer kan även påverkas av ett stort vårdbehov för de personer som har insjuknat av coronavirus och av minskade sjukvårdsresurser på grund av sjukfrånvaro.

### Rekommendation

Omhändertagandet av män med misstänkt eller känd prostatacancer, inklusive det standardiserade vårdförloppet, kan behöva anpassas till pandemin.

Eftersom pandemin kan komma att påverka sjukvården under mycket lång tid, bör sjukvårdshuvudmännen i görligaste mån undvika åtgärder som skapar långa köer med patienter som inte omhändertas på ett säkert sätt. Det nationella vårdprogrammets rekommendationer om utredning, behandling och omvårdnad bör om möjligt följas.

Smittrisk och förutsättningar för olika sjukvårdande åtgärder varierar mellan olika orter och sjukvårdsorganisationer. Därför behöver samtliga regioner och enskilda vårdgivare ta ställning till vilken anpassning som behöver göras med anledning av pandemin, inklusive åtgärder för att minska smittspridningen.