

Flödesschema för uppföljning i SAMS-FU, Arm A (extensiv ombiopsi, glesare uppföljning)

Uppföljning ska göras inom (+/-) 1 månad från schemalag månad.

Kalenderår och -månad fylls i på de tomma raderna.

Om man vill, kan man fylla i PSA-värdena under för att få översikt av utvecklingen.

Efter avslutad aktiv monitorering följs patienterna enligt klinisk rutin. Inrapportering till SAMS fortsätter att göras årligen. Skelettscint ska göras minst årligen om PSA är > 50 µg/l för patienter utan och > 25 µg/l med hormonell behandling, om inte fjärrmetastaser konstaterats tidigare.

Månad	-3 - 0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48
År					1				2		3		4
Månad													
År													
PSA-värde													
PSA	x		x		x		x		x	x	x	x	x
Palpation	x				x				x		x		x
TRUL/biopsier*	x												

Månad	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	172	180
År		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
Månad																						
År																						
PSA-värde																						
PSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Palpation		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
TRUL/biopsier*																						

* Inga schemalagda biopsier under uppföljningen. Om PSA når nivån för behandlingsindikation och man avstår från behandling, utförs extensiv biopsiering enligt samma mall som den initiala, extensiva ombiopsin.

Flödesschema för uppföljning i SAMS-FU, Arm B (ombiopsi och uppföljning enligt standard)

Uppföljning ska göras inom (+/-) 1 månad från schemalag månad.

Kalenderår och -månad fylls i på de tomma raderna.

Om man vill, kan man fylla i PSA-värdena under för att få översikt av utvecklingen.

Efter avslutad aktiv monitorering följs patienterna enligt klinisk rutin. Inrapportering till SAMS fortsätter att göras årligen. Skelettscintigram ska göras minst årligen om PSA är > 50 µg/l för patienter utan och > 25 µg/l för patienter med hormonell behandling, om inte fjärrmetastaser konstaterats tidigare.

Månad	-3 - 0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48
År					1				2		3		4
Månad													
År													
PSA-värde													
PSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Palpation	x		x		x		x		x				x
TRUL/biopsier*	x								x				x

Månad	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	172	180
År		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
Månad																						
År																						
PSA-värde																						
PSA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Palpation		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
TRUL/biopsier*				x				x				x				x				x		

* Inga schemalagda biopsier under uppföljningen. Om PSA når nivån för behandlingsindikation och man avstår från behandling, utförs extensiv biopsiering enligt samma mall som den initiala, extensiva ombiopsin.