





# **Lokalisering av biopsier i förhållande till STHLM-3-mallen**


# ULTRALJUDSVY 1



# ULTRALJUDSVY 2



# PALPATORISK VY




**Perifera delen av perifera zonen = 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C**

**Paramediant från perifera zonen = 2B, 3B**


**Anteriora biopsier = 5A, 6A, 5B, 6B, 5C, 6C**

# SAMS FU A (extensiv)

< 30 cc (15-19 kolvar)



Anteriora biopsier




Posteriora biopsier


14 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer

# SAMS FU A (extensiv)

30 - 59 cc (19-22 kolvar)



Anteriora biopsier




Posteriora biopsier


18 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer

# SAMS FU A (extensiv)

60 - 89 cc (23-27 kolvar)



**Anteriora biopsier**




**Posteriora biopsier**

**18 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer**

# SAMS FU B & Obs (standard)

< 30 cc (9-13 kolvar)




Posteriora biopsier

8 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer

# SAMS FU B & Obs (standard)

30-59 cc (11-15 kolvar)




Posteriora biopsier

10 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer

# SAMS FU B & Obs (standard)

60-89 cc (13-17 kolvar)



Posteriora biopsier

12 biopsier enligt mall + 1-2 biopsi från varje ställe med tidigare cancer