

## Canceranmälan via kvalitetsregister eller via canceranmälningsblanketten

Nedanstående tabell listar alla cancerdiagnoser som har ett kvalitetsregister, samt vilka fall som ska anmälas till respektive kvalitetsregister. Vanligen sker rapporteringen direkt via INCA, och anmälan till kvalitetsregistret gäller då som klinisk canceranmälan. Vid användande av pappersblankett var noga med att använda aktuell blankett.

**Anmälan via canceranmälningsblanketten** "Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet" gäller för:

- Cancerdiagnoser som saknar kvalitetsregister
- Fall som ej skall anmälas till kvalitetsregister beroende på exklusionskriterier– exv. histologi, ålder etc.
- Metastas med okänd primärtumör
- Alla obduktionsupptäckta fall

**Glöm inte bort** att även fall där cancerdiagnos ställs utan någon patologisk anatomisk undersökning ska anmälas, antingen via kvalitetsregister eller canceranmälningsblankett.

Diagnos	Kvalitetsregister	Vanlig canceranmälan
<b>AML/AUL/ALL</b>	Nyupptäckta fall hos patienter 16 år och äldre. Ej 16–19-åringar som handläggs vid pediatrik klinik	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Analcancer</b>	ICDO C21* (anus) Invasiv skivepitelcancer, basaloid cancer, kloakogen cancer samt AIN III-anal intraepitelial neoplasi grad III, skivepitel ska ingå i registret.	Obduktionsupptäckta fall.
<b>Bröstcancer</b>	Nyupptäckta bröstcancerfall, alla diagnostyper, såväl invasiv som in situ.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Cervix och vagina</b>	Nyupptäckt primär PAD-verifierad cervix- eller vaginalcancer hos patienter 18 år och äldre.	Grav dysplasi, cancer in situ, HSIL (CIN II- III) och VAIN III. Misstanke. Obduktionsupptäckta fall.
<b>Corpus</b>	Nyupptäckt primär PAD-verifierad corpuscancer hos patienter 18 år och äldre.	Cancer in situ, endometrie-hyperplasi med grav/stark dysplasi. Misstanke. Obduktionsupptäckta fall.
<b>Hypofys</b>	Samtliga nyupptäckta primära hypofysadenom hos patienter 18 år och äldre.	Misstanke. Obduktionsupptäckta fall.
<b>Esofagus/ventrikel</b>	Alla diagnostiserade fall, invasiva och in-situ (höggradig dysplasi).	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Hjärntumör</b>	Primära hjärntumörer hos patienter 18 år och äldre, enbart röntgendiagnostiserade eller PAD-verifierade.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Huvud-halscancer</b>	Nyupptäckt primär huvud- och halscancer. Metastas med okänd primärtumör, där misstanke finns på primärtumör i huvud-halsområdet. Patient med ny primärtumör registreras på nytt.	Cancer in situ, misstanke och övriga fall. Obduktionsupptäckta fall.

Diagnos	Kvalitetsregister	Vanlig canceranmälan
<b>KML och KLL</b>	Nyupptäckta fall hos patienter 16 år och äldre. Ej 16-19-åringar som handläggs vid pediatrik klinik.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Kolorektalcancer</b>	Nyupptäckta PAD-verifierade infiltrerande adenocarcinom.	In-situ, grava dysplasier, carcinoider etc. Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Lever, gallvägs- och gallblåsecancer</b>	Nydiagnostiserade fall av primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar. Metastaserande cancer till lever, som behandlas med ablativ eller kirurgisk behandling. Benigna tumörer som behandlas med ablativ eller kirurgisk behandling. Ålder: ≥ 16 år  För läge <b>C24.0</b> kan tumören inkluderas antingen i Pancreascancerregistret eller i registret för tumörer i Lever-gallvägar beroende på vilken typ av kirurgi som utförts.	Ålder: <16 år Obduktionsupptäckta fall. Misstanke.
<b>Lungcancer</b>	Invasiv primär lungcancer, även kliniskt ställda diagnoser.	Cancer in situ, Pleuratumörer (mesoteliom) Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Lymfom</b>	Alla maligna lymfom inklusive Hodgkins lymfom för patienter 16 år och äldre. Ej 16–19-åringar som handläggs vid pediatrik klinik.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Malignt melanom</b>	PAD/Cyt-verifierade fall av kutana primära maligna melanom – läge C44* ICD-O/3  Melanom på läpproda, genital hud samt anal hud ingår ej.	Obduktionsupptäckta fall. Dysplastiska naevi med <b>grav</b> dysplasi. In situ melanom Andra lägen t ex öga etc. Misstanke och övriga fall.
<b>Myelodysplastiskt syndrom (MDS)</b>	Nyupptäckta fall av MDS.	Misstanke på tumör. Obduktionsupptäckta fall.
<b>Myelom</b>	Nyupptäckta fall av myelom för patienter 16 år och äldre.	Nyupptäckta fall som handläggs vid barnhematologi eller vårdas på pediatrik klinik >16 år. Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.

Diagnos	Kvalitetsregister	Vanlig canceranmälan
<b>Myeloproliferativa sjukdomar (MPD)</b>	Alla nyupptäckta fall av MPD. (MPD = Polycytemia vera, Essentiell trombocytemi och Myelofibros, Myeloproliferativ sjukdom UNS, Kronisk neutrofil leukemi och Kronisk eosinofil leukemi/hypereosinofilt syndrom)	Misstanke på tumör. Obduktionsupptäckta fall.
<b>Njurcancer</b>	Nyupptäckta fall av njurcancer. OBS! Glöm ej röntgendiagnostiserade fall.	Oncocytom. Sarkom Wilms tumör. Obduktionsupptäckta fall. Misstanke
<b>Ovarialcancer</b>	<b>PAD- eller cytologi verifierad:</b> <b>Ovarialcancer C56.9</b> Nyupptäckt malign ovarialcancer hos patienter 18 och äldre. Innefattar Borderlinetumör och Sarkom <b>Tubarcancer C57.0</b> Nyupptäckt malign cancer i tuba (äggledare) (innefattar sarkom). <b>Peritonealcancer C48.1</b> Peritonealcancer med specificerad lokalisation med ovarialliknande histologi men anses utgå från peritoneala celler. <b>Peritonealcancer C48.2</b> Peritonealcancer utan specificerad lokalisation med ovarialliknande histologi men anses utgå från peritoneala celler. <b>Cancer abdominis C76.2</b> Nyupptäckt tumör i Abdominis (buk) med ovarialliknande histologi där primärtumörens utgångspunkt är osäker. <b>Cancer pelvis C76.3</b> Nyupptäckt tumör i Pelvis (bäcken) med ovarialliknande histologi där primärtumörens utgångspunkt är osäker.	Misstanke. Benigna tumörer. Obduktionsupptäckta fall. Andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan, C57.1 – C57.9.
<b>Pancreascancer</b>	Alla invasiva tumörer och in situ-tumörer. Även vissa benigna tumörer som enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:7 är anmälningspliktiga.  För läge <b>C24.0</b> kan tumören inkl. antingen i Pancreascancerregistret eller i registret för tumörer i Levergallvägar beroende på vilken typ av kirurgi som utförts.	Misstanke på tumör Obduktionsupptäckta fall

Diagnos	Kvalitetsregister	Vanlig canceranmälan
<b>Peniscancer</b>	Alla nydiagnostiserade fall av invasiv skivepitelcancer och cancer in situ inklusive MB Bowen och Erytroplasia Queyrat. Även kliniskt ställda diagnoser.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke
<b>Prostatacancer</b>	Infiltrerande adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Även kliniskt ställda diagnoser.	Cancer in situ. PIN (Prostatiskt Intraepitelial Neoplas) grad III. Obduktionsupptäckta fall. Misstanke och övriga fall.
<b>Sarkom</b> <i>Sarkom i extremiteter och bålvägg</i>	Alla nyupptäckta mjukdels- och bensarkom med SNOMED: 8001/1 8001/3 – 8920/3 utom 8832/3 och 8833/3 9020/1 och 9020/3 9040/3 – 9043/3 9120/3 – 9261/3 utom 9140/3 och 9124/3 9370/3 9522/3 9540/3 – 9581/3	Obduktionsupptäckta fall Misstanke
<b>Sarkom</b> <i>Viscerala och retroperitoneala</i>	Alla nyupptäckta fall med SNOMED: 8800X-9262X 954XX-958XX	Neuroblastom Obduktionsfynd.
<b>Testikelcancer</b>	Män ≥ 16 år med nydiagnostiserade  <b>Seminom</b> SNOMED/3: 90613 <b>Non-seminom</b> SNOMED/3: 91013, 91003, 90703, 90713, 90853, 90653, 90813, 90803, 90613/0 <b>Extragonadala retroperitoneala och mediastinala seminom =</b> C48.0 och C38.3	Obduktionsupptäckta fall Misstanke och övriga fall.
<b>Tyreoidea</b>	Nyupptäckt primär tyreoideacancer.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke
<b>Urinblåsecancer</b>	Nyupptäckt primär PAD-verifierad urinblåsecancer, alla diagnostyper, hos patienter 18 år och äldre.	Obduktionsupptäckta fall. Papillom. Samtliga med endast cytologi (diagnosgrund 5). Misstanke

<b>Diagnos</b>	<b>Kvalitetsregister</b>	<b>Vanlig canceranmälan</b>
<b>Uretra</b> <b>Uretär</b> <b>Njurbäcken</b>	Nyupptäckt primär PAD-verifierad urotelialcancer hos patienter 18 år och äldre.	Obduktionsupptäckta fall. Misstanke Misstanke på cancer vid röntgen, ultraljud eller cytologi, utan verifikation med PAD.
<b>Vulva</b>	Nyupptäckt primär PAD-verifierad vulvacancer hos patienter 18 år och äldre.  Från och med 170101 ingår även Morbus Paget.	Grav dysplasi, cancer in situ, VIN III. Misstanke.  Obduktionsupptäckta fall.

2017-06-21