

Maximala ledtider (antal dagar) för nationell uppföljning, från beslut VGM till start första behandling

SVF	Basutredning									Utökad utredning <sup>6</sup> VXX44						Ingen ytterligare åtgärd VXX73
	Kirurgi VXX50	Läkemedel VXX52	Strålning VXX54	Palliativ <sup>1 2</sup> VXX58	Annan VXX59	Expektans VXX60	Annan cancer VXX72	Ingen ytterligare åtgärd VXX73	Misstanke om cancer avskrivs VXX78	Kirurgi VXX50	Läkemedel VXX52	Strålning VXX54	Palliativ <sup>1 2</sup> VXX58	Annan VXX59	Expektans VXX60	
Åkuta leukemier		9		X <sup>1</sup>												
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer							22 <sup>4</sup>		22 <sup>4</sup>							
Analcancer	46	46	46	32 <sup>1</sup>	46											
Bröstcancer	28	28	28	X <sup>1</sup>												
Buksarkom	39	39	39	28 <sup>1</sup>		28										
Bukspottkörtelcancer	36	29		22 <sup>1</sup>		22				43	36		X <sup>1</sup>			
Gallblåsecancer	36	29		22 <sup>1</sup>	29	22				43	36		X <sup>1</sup>	36	29	
Hjärntumörer		48	48	X <sup>1</sup>				37							X <sup>5</sup>	72
Hudmelanom	33	57	57	X <sup>1</sup>	57	57		26			97	97	X <sup>1</sup>			
Huvud- och halscancer	30	38	38	18 <sup>2</sup>												
KLL		22	26	X <sup>1</sup>		16										
Levercancer	36	29		22 <sup>1</sup>		22				43	36		X <sup>1</sup>	55	29	
Livmoderhalscancer (cervix)	21	25	25	11 <sup>1</sup>				X <sup>5</sup>								
Livmoderkroppscancer (endometrie)	32	39	39	25 <sup>1</sup>												
Lungcancer	44	40	44	30 <sup>1</sup>												
Lymfom		18	26	X <sup>1</sup>		16										
Matsrupe- och magsäckscancer	38	31	38	24 <sup>1</sup>		24										
Myelom		20	20	15 <sup>1</sup>		15										
Neuroendokrina buktumörer	56	49	49	35 <sup>1</sup>	7 <sup>3</sup>			35								
Njurcancer	27	27	27	X <sup>1</sup>		27				41	41	41	X <sup>1</sup>		41	
Okänd primärtumör, CUP	35	28	35	24 <sup>1</sup>						55	48	55	44 <sup>1</sup>			
Peniscancer	31	27		17 <sup>2</sup>				X <sup>5</sup>								
Prostatacancer	61	50	68	X <sup>1</sup>		47										
Skelett- och mjukdelssarkom	39	39	39	28 <sup>1</sup>	28											
Sköldkörtelcancer	31			X <sup>1</sup>												
Testikelcancer		31	38	X <sup>1</sup>	34											
Tjock-och ändtarmscancer	39	39	39	25 <sup>2</sup>	39					53	53	53	39 <sup>2</sup>	53		
Urinblåse- och urinvägscancer	37	39	43	22 <sup>1</sup>				22								
Vulvacancer	30	27	34	20 <sup>1</sup>												
Äggstockscancer	24	22		X <sup>1</sup>												

<sup>1</sup> Gäller palliativ, symtomlindrande behandling. X innebär att maximal ledtid saknas. För tumorspecifik palliativ behandling gäller i dessa vårdförlopp samma ledtid som för kurativt syftande behandling.

<sup>2</sup> För HH cancer, peniscancer och kolorektal cancer gäller den maximala ledtiden såväl symtomlindrande som tumorspecifik palliativ behandling.

<sup>3</sup> Gäller NEC/binjurebarkscancer oavsett vilken behandlingstyp, ska starta 7 dagar efter att diagnosen är säkerställd.

<sup>4</sup> Vårdförloppet avslutas i och med att patienten får information om utredningens resultat i ett avslutande samtal. Fortsatt utredning och eventuell behandling ingår därför inte i vårdförloppet och koderna för start av behandling kan inte användas.

<sup>5</sup> Koden finns men maximal ledtid saknas

<sup>6</sup> Markeras med kod VXX44 som är obligatorisk. För hjärntumörer motsvarar koden lågmalign tumör

Sammanställningen är gjord av RCC och uppdateras av Pia Jestin, RCC Uppsala Örebro. Senast uppdaterad 2019-06-20.